



Teachingninja.in



Latest Govt Job updates



Private Job updates



Free Mock tests available

Visit - teachingninja.in



MPPSC

Previous Year Paper Assistant Professor Statistics



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेन्सी एरिया
इन्दौर


क्रमांक : 169/69/2011/प-9

इन्दौर, दिनांक-13.07.2018

अंतिम उत्तर कुंजी

--: विज्ञप्ति ::--

सहायक प्राध्यापक परीक्षा-2017 के संदर्भ में आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 120/69/2011/प-9 दिनांक 30.06.2018 के अंतर्गत प्रावधिक उत्तर कुंजी परीक्षा परिणाम बनाने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया गया तथा समस्त ऑनलाईन आपत्तियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात विषय-सांख्यिकी प्रश्न पत्र की अनुशंसित संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी बनाई गई है। यह अंतिम उत्तर कुंजी है। इस अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अतः अब इस संबंध में अभ्यर्थियों की किसी प्रकार की आपत्तियों/अभ्यावेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर एवं प्रवेश पत्र पर दिये गये पासवर्ड की सहायता से लॉग-इन कर अपनी रिस्पांस शीट का अवलोकन कर सकते हैं। यह विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com & www.mppscdemo.in पर दिनांक 13.07.2018 से उपलब्ध है।


(डॉ. पी.सी. यादव)
परीक्षा नियंत्रक

Assistant Professor Exam - 2017

(Final Answer Key)

Statistics

Let X be a random variable whose probability density function is		माना X एक यादृच्छिक चर है जिसका प्रायिकता घनत्व फलन है	
Q.No: 1	$f(x) = \begin{cases} 1; & 0 \leq x \leq 1 \\ 0; & \text{otherwise} \end{cases}$		$f(x) = \begin{cases} 1; & 0 \leq x \leq 1 \\ 0; & \text{अन्यथा} \end{cases}$
	Then $P_r(X = 1)$ is		तो $P_r(X = 1)$ का मान है:
A	1		1
B	0		0
C	1/2		1/2
D	3/4		3/4

Q.No: 2 The standard deviation of a binomial distribution with parameters n=16 and p=1/4 is:		एक द्विपद बंटन जिसके प्राचल हैं n=16 तथा p=1/4 उसका मानक विचलन है:	
A	3		3
B	4		4
C	$\sqrt{3}$		$\sqrt{3}$
D	2		2

Q.No: 3 An unbiased coin is tossed 6 times and it gives 4 'heads'. What is the probability of getting 'head' in seventh toss?		एक अनभिनत सिक्का 6 बार उछाला जाता है तथा 4 बार 'चित' आता है। सातवीं उछाल में 'चित' आने की प्रायिकता क्या है ?	
A	1/2		1/2
B	3/7		3/7
C	4/7		4/7
D	5/7		5/7

Q.No: 4 If A and B are mutually exclusive events and $P(A \cup B) \neq 0$, then which one of the following is true?		यदि A तथा B परस्पर अपवर्जी घटनायें हैं तथा $P(A \cup B) \neq 0$, तो निम्न में कौन सत्य है ?	
A			



	$P(A/A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}$	$P(A/A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}$
B	$P(A/A \cup B) \leq \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}$	$P(A/A \cup B) \leq \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}$
C	$P(A/A \cup B) \geq \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}$	$P(A/A \cup B) \geq \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}$
D	$P(A/A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) - P(B)}$	$P(A/A \cup B) = \frac{P(A)}{P(A) - P(B)}$

Q.No: 5	A random variable X has a normal distribution. Its moment generating function about origin is $M_x(t) = \exp [2t + 32t^2]$. Its fourth central moment is	एक यादृच्छिक चर X का बंटन प्रसामान्य है। इसका आधुनिक जनक फलन शून्य के सापेक्ष है $M_x(t) = \exp [2t + 32t^2]$. तो इसका चतुर्थ केन्द्रीय आघूर्ण है:
A	4096	4096
B	10096	10096
C	11288	11288
D	12288	12288

Q.No: 6	If for a binomial distribution $b(n,p)$, $P(x=0) = P(x=1)$ then coefficient of variation is:	यदि द्विपद बंटन $b(n,p)$ के लिये $P(x=0) = P(x=1)$ है तो विचरण गुणांक है:
A	n	n
B	1	1
C	Np	Np
D	P	P

Q.No: 7	The random variable X has the cumulative distribution function $F(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & ; a \leq x \leq b \\ 1 & ; x \geq b \end{cases}$ If $a = -3$ and $b = 4$ the probability that $ X \leq 1/2$ is:	यादृच्छिक चर X का संवयी बंटन फलन है $F(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & ; a \leq x \leq b \\ 1 & ; x \geq b \end{cases}$ यदि $a = -3$ तथा $b = 4$ है तो घटना $ X \leq 1/2$ की प्रायिकता है:
A	1/3	1/3
B	1/5	1/5



C	1/7	1/7
D	1/9	1/9

Q.No: 8	Let X be a random variable whose probability density function is $f(x)=\theta \exp(-\theta x); 0 < x < \infty, \theta > 0$. the value of $E(X^2)$ is :	माना X एक यादृच्छिक चर है जिसका प्रायिकता घनत्व फलन है $f(x)=\theta \exp(-\theta x); 0 < x < \infty, \theta > 0$ तब $E(X^2)$ का मान है:
A	$\frac{1}{\theta}$	$\frac{1}{\theta}$
B	$\frac{1}{\theta^2}$	$\frac{1}{\theta^2}$
C	$\frac{1}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}$	$\frac{1}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}$
D	$\frac{2}{\theta^2}$	$\frac{2}{\theta^2}$

Q.No: 9	The probability density function of a random variable X is $f(x) = \begin{cases} \exp(-x), & x > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ Then the probability density function of $y = +\sqrt{x}$ is	एक यादृच्छिक चर का प्रायिकता घनत्व फलन X है $f(x) = \begin{cases} \exp(-x), & x > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ तो $y = +\sqrt{x}$ का प्रायिकता घनत्व फलन है:
A	ye^{-y}	ye^{-y}
B	$y^2 e^{-y^2}$	$y^2 e^{-y^2}$
C	ye^{-y^2}	ye^{-y^2}
D	$2ye^{-y^2}$	$2ye^{-y^2}$

Q.No: 10	One integer is chosen at random from first two hundred positive integers probability that this integer is divisible by 6 and 8 is:	प्रथम 200 पचासक पूर्णांकों में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। चुनी गयी संख्या 6 तथा 8 से विभाजन होने की प्रायिकता है:
A	0.04	0.04
B	0.08	0.08
C	0.25	0.25
D	0.50	0.50



Q.No: 11	If the probability density function of a normal distribution is proportional to $\exp\left[-\frac{x^2}{4} + 5x\right]$, then its mean is	यदि प्रसामान्य बंटन का प्रायिकता घनत्व फलन $\exp\left[-\frac{x^2}{4} + 5x\right]$ के समानुपाती हो तो इसके माध्य का मान है:
A	0	0
B	5	5
C	10	10
D	2	2

Q.No: 12	Let X follows a binomial distribution $b(2,p)$, Y follows binomial distribution $b(5,p)$ and $P(X \geq 1) = 5/4$, then value of $P(Y \geq 1)$ is	यदि X का बंटन द्विपद $b(2,p)$, Y का बंटन, द्विपद $b(5,p)$ तथा $P(X \geq 1) = 5/4$, तो $P(Y \geq 1)$ का मान है:
A	32/243	32/243
B	211/243	211/243
C	112/243	112/243
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Question Solution

Q.No: 13	If X and Y are independent Poisson Variables such that $P(X=2)=P(X=3)$, $P(Y=3)=P(Y=4)$ Then variance of $(X-3Y)$ is	यदि X तथा Y क्रमशः स्वतंत्र प्वासो चर इस प्रकार हैं कि $P(X=2)=P(X=3)$, $P(Y=3)=P(Y=4)$ तब $(X-3Y)$ का प्रसरण है:
A	3	3
B	24	24
C	36	36
D	39	39

Q.No: 14	If X and Y are two independent random variables with probability density function respectively	यदि X तथा Y दो स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं। जिनके प्रायिकता घनत्व फलन क्रमशः हैं:
		$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right); -\infty < x < \infty$
		$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{8}(y-3)^2\right]; -\infty < y < \infty$
		तो यादृच्छिक चर $(X-Y)$ का प्रसरण है:



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right); -\infty < x < \infty$$

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{8}(y-3)^2\right]; -\infty < y < \infty$$

Then, variance of random variable $(X-Y)$ is:

A	2	2
B	4	4
C	5	5
D	7	7

Q.No: 15 The mean of ten observations is 10 and standard deviation is Zero. The median of these observations is

दस सर्वकों का माध्य 10 है तथा मानक विचलन शून्य है। इनकी माधिका का मान है:

A	8	8
B	10	10
C	11	11
D	9	9

Q.No: 16 If the correlation coefficient between X and Y is r, correlation coefficient between 4X and -4Y is:

यदि X तथा Y के बीच सहसम्बंध गुणांक r है तो 4X तथा -4Y के बीच सहसम्बंध गुणांक है:

A	r	r
B	4r	4r
C	-4r	-4r
D	-r	-r

Q.No: 17 Which of the following statements is wrong ?

निम्न में कौन सा कथन गलत है ?

A	β_1 gives a measure of departure from symmetry	β_1 सममित से दूरी की माप देता है।
B	β_2 gives a measure of departure from symmetry	β_2 सममित से दूरी की माप देता है।
C	β_2 gives a measure of peakedness	β_2 छुड़दता की माप देता है।
D	$\beta_2 > \beta_1$	$\beta_2 > \beta_1$

Q.No: 18 The rank correlation coefficient between the marks in Statistics and Mathematics

किसी वर्ग के छात्रों द्वारा सांख्यिकी तथा गणित में प्राप्त किये गये अंकों के बीच कोटि सहसम्बंध गुणांक 0.8 है।



obtained by a group of students is 0.8. If sum of squares of difference in ranks is given to be 33, the number of students in the group is		यदि कॉटियों में अन्तर के वर्गों का योग 33 है तो वर्ग में छात्रों की संख्या है:	
A	10		10
B	25		25
C	100		100
D	500		500

Q.No: 19 When all the observations are multiplied by k, then variance is doubled. The value of k is		जब समस्त प्रेक्षकों को k से गुणा कर दिया जाता है, तो उनका प्रसरण दुगुना हो जाता है। k का मान है:	
A	1/2		1/2
B	1/√2		1/√2
C	√2		√2
D	2		2

Q.No: 20 Which of the following statements is not true?		निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है ?	
A	$r_{yx}^2 \leq 1$		$r_{yx}^2 \leq 1$
B	$b_{yx} b_{xy} \leq 1$		$b_{yx} b_{xy} \leq 1$
C	$b_{xy} = -1.5, b_{yx} = -0.9$		$b_{xy} = -1.5, b_{yx} = -0.9$
D	$b_{yx} = 2, b_{xy} = \frac{1}{3}$		$b_{yx} = 2, b_{xy} = \frac{1}{3}$

Q.No: 21 If $20x - 9y = 107$ and $4x - 5y + 32 = 0$ are two regression lines then correlation coefficient between x and y is		यदि $20x - 9y = 107$ तथा $4x - 5y + 32 = 0$ दो समाश्रयण रेखाएँ हैं तो उनके बीच का सहसम्बन्ध गुणांक है:	
A	4/5		4/5
B	3/5		3/5
C	9/20		9/20
D	None of these		कोई सही नहीं है

Q.No: 22 If $V(X-Y) > V(X+Y)$, then correlation coefficient r_{XY} between X and Y is		यदि $V(X-Y) > V(X+Y)$ तो X तथा Y के बीच सहसम्बन्ध गुणांक r_{XY} है:	
--	--	---	--



A	$r_{XY} = 0$	$r_{XY} = 0$
B	$r_{XY} = 1$	$r_{XY} = 1$
C	$r_{XY} > 0$	$r_{XY} > 0$
D	$r_{XY} < 0$	$r_{XY} < 0$

Q.No: 23 If $\sigma_x = 0.5$, $\sigma_y = 1.5$ and $\sigma^2_{(x-y)} = 1.25$; correlation coefficient between x and y is		यदि $\sigma_x = 0.5$, $\sigma_y = 1.5$ तथा $\sigma^2_{(x-y)} = 1.25$ तो x तथा y के बीच सहसम्बन्ध गुणांक है:
A	5/6	5/6
B	1/2	1/2
C	1/4	1/4
D	0	0

Q.No: 24 The sum of deviations taken from median is :		माध्यिक से लिये गये विचलनों का योग होता है
A	Always Positive	सदैव धनात्मक
B	Zero	शून्य
C	Always Negative	सदैव ऋणात्मक
D	All of these	सभी सही है

Question Deleted

Q.No: 25 If each value of X is halved and that of Y is doubled regression coefficient of X and y becomes		यदि X के सभी मान आधे कर दिये जाते हैं तथा Y के सभी मान दो गुने कर दिये जाते हैं तो X पर Y का समाश्रयण गुणांक हो जाता है:
A	Unchanged	अपरिवर्तित
B	Halved	आधा
C	Doubled	दो गुना
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 26 If $y=mx+4$ and $x=4y+5$ are regression lines of y on x and x on y respectively, the value of m is between		यदि y पर x तथा x पर y की समाश्रयण रेखाएँ क्रमशः $y=mx+4$ तथा $x=4y+5$ हैं, तो m का मान है:
A	0 and 1	0 तथा 1 के बीच
B	0 and 1/2	0 तथा 1/2 के बीच



C	0 and 1/4	0 तथा 1/4 के बीच
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 27	The sum of the squares of the deviations of a set of values is minimum when deviations are taken about	किसी समूह के विचलनों के वर्ग का योग तब न्यूनतम होता है जब विचलन निम्न मापों में से किसके सापेक्ष लिये जाते हैं ?
A	Arithmetic Mean	समानान्तर माध्य
B	Harmonic Mean	हरात्मक माध्य
C	Geometric Mean	गुणोत्तर माध्य
D	Median	माध्यिका

Q.No: 28	A person drives his scooter from his home to his office at a speed of 30km per hour and back from the office to his house at 20km per hour, then the average speed is (in km per hour)	एक व्यक्ति अपना स्कूटर अपने घर से अपने कार्यालय तक 30 कि.मी प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तथा वापस 20 कि.मी प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। उसकी औसत गति है:
A	23	23
B	24	24
C	25	25
D	26	26

Q.No: 29	A bag contains 5 black and 4 white balls. A man selects two balls at random. The probability that both these are of same colour is	एक थैले में 5 काली तथा 4 सफेद गेंदे हैं। एक व्यक्ति यादृच्छिक, रूप से दो गेंदे निकालता है। वे दोनों गेंदे एक ही रंग की हैं, इसकी प्रायिकता होगी :
A	1/6	1/6
B	5/108	5/108
C	4/9	4/9
D	5/18	5/18

Q.No: 30	For the grouped data having equal width h for each class interval Sheppard's corrected μ_3 equals to	वर्गीकृत आंकड़ों में जहाँ कक्षा अन्तराल सभी कक्षाओं में एक समान h है, 'शैपर्ड' के संशोधन' लगाने के बाद सही तृतीय केन्द्रीय आधुन का मान होगा :
A	$\mu_3 - \frac{h^2}{12}$	$\mu_3 - \frac{h^2}{12}$
B	μ_3	μ_3



C	$\mu_3 + \frac{h^2}{12}$	$\mu_3 + \frac{h^2}{12}$
D	$\mu_3 - \frac{h^2 - \mu_2}{2}$	$\mu_3 - \frac{h^2 - \mu_2}{2}$

Q.No: 31 If arithmetic mean, median and mode of a distribution are same and their value is 7, the values of its 5th decile should be

यदि एक बंटन के समानान्तर माध्य, माधिका तथा बहुलक समान हो तथा उनका मान 7 है, तो 5 वें दशांक का मान होना चाहिये:

A	7	7
B	12	12
C	35	35
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 32 If X follows $N(0,1)$ and $Y = \begin{cases} 1 & \text{if } X > 0 \\ -1 & \text{if } X \leq 0 \end{cases}$
Then $E(Y)$ is equal to

यदि X का बंटन $N(0,1)$ तथा $Y = \begin{cases} 1 & \text{यदि } X > 0 \\ -1 & \text{यदि } X \leq 0 \end{cases}$
तो $E(Y)$ का मान है

A	1	1
B	1/2	1/2
C	Zero	शून्य
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 33 X_1 and X_2 are independent variates with means 4 and 9 and standard deviations 1 and 2 respectively. The correlation coefficient between $u=2X_1+X_2$ and $v=X_1-2X_2$ is:

X_1 तथा X_2 स्वतंत्र चर हैं क्रमशः माध्य 4 एवं 9 तथा मानक विचलन 1 एवं 2 हैं। $u=2X_1+X_2$ तथा $v=X_1-2X_2$ के बीच सहसम्बंध गुणांक है:

A	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
B	0	0
C	-6/13	-6/13
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 34 Two regression lines of Y on X and X on Y are respectively

$Y = \frac{l}{m}X + C$ and $X = \frac{m^*}{l^*} + C^*$. Then which one is true?

- A $lm^* \leq l^*m$
 B $lm^* \geq l^*m$
 C $lm^* = l^*m$
 D None of these

Y पर X तथा X पर Y दो समाश्रयण रेखाएँ क्रमशः $Y = \frac{l}{m}X + C$ तथा $X = \frac{m^*}{l^*} + C^*$ है तो निम्न में कौन सा सत्य है?

- A $lm^* \leq l^*m$
 B $lm^* \geq l^*m$
 C $lm^* = l^*m$
 D इनमें से कोई नहीं

Q.No: 35 Let x_1, x_2, \dots, x_n be a random sample taken from $N(\mu, \sigma^2)$. The sufficient statistic for μ when σ^2 is known, is:

- A $\sum x_i$
 B $\sum x_i^2$
 C $\frac{1}{n} \sum x_i^2$
 D None of these

समष्टि $N(\mu, \sigma^2)$ से x_1, x_2, \dots, x_n एक यादृच्छिक प्रतिदर्श है। यदि σ^2 का मान दिया हो तो μ का पर्याप्त प्रतिदर्श है:

- A $\sum x_i$
 B $\sum x_i^2$
 C $\frac{1}{n} \sum x_i^2$
 D इनमें से कोई नहीं

Q.No: 36 How many parametric values are specified for the simple hypothesis in a bivariate normal distribution?

- A 2
 B 3
 C 4
 D 5

द्विचर प्रसामान्य बंटन के लिये सरल परिकल्पना कितने प्राचलों के मान को निर्दिष्ट करती है ?

- 2
 3
 4
 5

For testing $H_0: \sigma = \sigma_0$ in a normal distribution $N(0, \sigma^2)$, the critical region is taken

Q.No: 37 as $\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq k$. The alternative hypothesis for which it gives an uniformly most powerful test is:

- A $\sigma \neq \sigma_0$
 B $\sigma < \sigma_0$

प्रसामान्य बंटन $H_0: \sigma = \sigma_0$ में $N(0, \sigma^2)$ के परीक्षण के लिये क्रान्तिक क्षेत्र $\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq k$ का प्रयोग किया गया। यह जिस वैकल्पिक परिकल्पना के लिये एक समान रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली परीक्षण है, वह है:

- $\sigma \neq \sigma_0$
 $\sigma < \sigma_0$



C	$\sigma > \sigma_0$	$\sigma > \sigma_0$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 38	For the population with probability density function $f(x, \theta) = (\theta + 1) \times \theta$; $0 < x < 1$, $\theta > -1$, Sample mean \bar{x} is an unbiased estimator of	किसी समष्टि के जिसका प्रायिकता घनत्व फलन $f(x, \theta) = (\theta + 1) \times \theta$; $0 < x < 1$, $\theta > -1$ है, प्रतिदर्श माध्य \bar{x} , एक अनभिनत आकलक है:
A	θ	θ
B	$\theta + 1$	$\theta + 1$
C	$\{(\theta + 1)/(\theta + 2)\}$	$\{(\theta + 1)/(\theta + 2)\}$
D	$1/(\theta + 2)$	$1/(\theta + 2)$

Q.No: 39	If x_1, x_2, \dots, x_n is a random sample from the pmf $f(x, p) = p^x (1-p)^{1-x}$; $x=0, 1$, $0 < p < 1$. Then, a sufficient statistic for p is	प्रायिकता मात्रा फलन x_1, x_2, \dots, x_n से एक यादृच्छिक प्रतिदर्श pmf $f(x, p) = p^x (1-p)^{1-x}$; $x=0, 1$, $0 < p < 1$ लिया है। तब, p का एक पर्याप्त प्रतिदर्श है:
A	x_1	x_1
B	$\sum_{i=1}^n x_i$	$\sum_{i=1}^n x_i$
C	x_n	x_n
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 40	If T_1 is most efficient estimator of θ with variance v_1 and T_2 is any other estimator of θ with variance v_2 , efficiency of T_2 with respect to T_1 is	यदि T_1 दक्षतम आकलक θ का है v_1 प्रसरण के साथ तथा T_2 कोई अन्य θ का आकलक है v_2 प्रसरण के साथ तो T_2 की दक्षता T_1 के सापेक्ष है:
A	v_2/v_1	v_2/v_1
B	v_1/v_2	v_1/v_2
C	$v_1 v_2$	$v_1 v_2$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 41	Which of the following testing problem makes use of Chi-square distribution?	निम्न परिकल्पना परीक्षकों में से किसमें कोई स्क्वायर बटन का प्रयोग होता है ?
A	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 = \sigma_0^2$



B	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
C	$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 = \mu_2$
D	$p_1 = p_2$	$p_1 = p_2$

Q.No: 42	Let \bar{x} be the mean of a random sample from $N(\mu, 1)$. If null hypothesis $H_0: \mu = \mu_0$ is rejected when $\bar{x} > \mu_0$, then the size of the test is	माना समष्टि $N(\mu, 1)$ से लिये गये एक यादृच्छिक प्रतिदर्श का माध्य \bar{x} है। यदि शून्य परिकल्पना $H_0: \mu = \mu_0$ अस्वीकृत की जाती है जब $\bar{x} > \mu_0$ तब परीक्षण का परिमाण है:
A	0.05	0.05
B	0.50	0.50
C	0.75	0.75
D	0.95	0.95

Q.No: 43	In a normal population $N(\mu, \sigma^2)$, let the MLE of σ^2 be s^2 . Then the MLE of fourth central moment of this population is:	एक प्रसामान्य समष्टि $N(\mu, \sigma^2)$ में यदि σ^2 का अधिकतम संभावित आकलन s^2 है तो समष्टि के चतुर्थ केन्द्रीय आघूर्ण का अधिकतम संभावित आकलन है:
A	$3s^4$	$3s^4$
B	s^4	s^4
C	$3s^2$	$3s^2$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 44	A maximum likelihood estimator of θ in $U(\theta, \theta+1)$ is:	बंटन $U(\theta, \theta+1)$ के लिये θ का महत्तम संभावित आकलन है:
A	$X(1)$	$X(1)$
B	$X(n)$	$X(n)$
C	Any number in $X(n)-1 < \theta < X(1)$	$X(n)-1 < \theta < X(1)$ में कोई संख्या
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 45	For the population $f(x) = \begin{cases} \exp[-(x-\theta)], & \theta < x < \infty \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$. The maximum likelihood estimator of θ based on random sample of size n is:	समष्टि $f(x) = \begin{cases} \exp[-(x-\theta)], & \theta < x < \infty \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$ के लिये n परिमाण के यादृच्छिक प्रतिदर्श पर आधारित θ का अधिकतम संभावित आकलन है:
A	Smallest observation	न्यूनतम प्रेक्षण

B	Largest observation	अधिकतम प्रेक्षण
C	Sample mean	प्रतिदर्श माध्य
D	Sample median	प्रतिदर्श मायिका

Q.No: 46 Let x_1, x_2 be a random sample from Poisson distribution with parameter λ . Then $\left(\frac{1}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2\right)$ is: माना x_1, x_2 पॉइसन बंटन से किसका प्राचल λ है, एक यादृच्छिक प्रतिदर्श है। तब, $\left(\frac{1}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2\right)$ है:

A	An unbiased estimator of λ	λ का अनभिनत आवसक
B	Consistent estimator of λ	λ का संगत आवसक
C	A biased estimator of λ	λ का अभिनत आवसक
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 47 If the sample mean of a random sample of size 16 from $N(\theta, 1)$ is 0.19, then 95% systematic confidence interval for θ is: यदि $N(\theta, 1)$ से लिये गये 16 आमाप के यादृच्छिक प्रतिदर्श का प्रतिदर्श माध्य 0.19 है तो $N(\theta, 1)$ का 95% सममित विश्वास्यता अन्तराल है:

A	(-0.30, 0.68)	(-0.30, 0.68)
B	(0.19, 0.60)	(0.19, 0.60)
C	(-0.22, 0.19)	(-0.22, 0.19)
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 48 Let X be a single observation from a binomial distribution with parameters $(5, p)$. Let $H_0: p = 1/5$ and $H_1: p = 2/5$. If H_0 is rejected when $X > 3$, probability of type I error is: माना कि प्राचलों $(5, p)$ वाले द्विपद बंटन से एक अकेला प्रेक्षण x है $H_0: p = 1/5$ तथा $H_1: p = 2/5$ है। यदि H_0 अस्वीकृत की जाती है जब कि $x > 3$ तो प्रथम प्रकार की त्रुटि की प्रायिकता है:

A	$\frac{20}{(5)^5}$	$\frac{20}{(5)^5}$
B	$\frac{21}{(5)^5}$	$\frac{21}{(5)^5}$
C	$\frac{1}{(5)^5}$	$\frac{1}{(5)^5}$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं



Q.No: 49	Let T be the number of successes in n independent Bernoulli trials with probability of successes θ . An unbiased estimator of θ^2 is:	सफलता की प्रायिकता θ वाले n स्वतन्त्र बर्नौली अभिप्रयोगों में सफलता की संख्या T है। तो θ^2 का अनभिनत आकलक है:
A	$(T/n)^2$	$(T/n)^2$
B	$T(T-1)/n(n-1)$	$T(T-1)/n(n-1)$
C	$T(n-T)/n(n-1)$	$T(n-T)/n(n-1)$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 50	If T is any consistent estimator of θ , another consistent estimator of θ is	यदि θ का संगत आकलक T है तो θ का एक अन्य संगत आकलक है
A	nT	nT
B	T+n	T+n
C	T-n	T-n
D	$nT/(n+1)$	$nT/(n+1)$

Q.No: 51	Which one of the following is true for estimation of mean of the normal distribution by sample median :	प्रतिदर्श माधिका द्वारा प्रसामान्य बंटन के माध्य के आकलन हेतु निम्न में से कोन सा सत्य है ?
A	unbiased but not consistent	अनभिनत परंतु संगत नहीं होता
B	consistent but not unbiased	संगत परंतु अनभिनत नहीं होता
C	both consistent and unbiased	संगत तथा अनभिनत दोनों होता है
D	neither consistent nor unbiased	न संगत तथा न अनभिनत होता है

Q.No: 52	For a UMP test of size α , state which of the following statements is true? (Where β is the probability of second kind of error)	α आकार वाले एक समान सामर्थ्यवान परीक्षण के लिये कोन सा कथन सत्य है ? (जबकि β द्वितीय प्रकार की त्रुटि की प्रायिकता है)
A	$\alpha \leq \beta$	$\alpha \leq \beta$
B	$(1 - \alpha) \leq \beta$	$(1 - \alpha) \leq \beta$
C	$\alpha = \beta$	$\alpha = \beta$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 53	Let the statistic T_1 be an unbiased estimator of parameter θ , while T_2 is a sufficient statistic for θ . Then the best statistic in the sense of variance is :	माना कि प्रतिदर्श T_1 प्राचल θ का एक अनभिनत आकलक है जबकि प्रतिदर्श T_2 प्राचल हेतु पर्याप्त है तो प्रसरण की दृष्टि से सबसे अच्छा प्रतिदर्श है:
A	T_1	T_1



B	T_2	T_2
C	$E(T_1/T_2)$	$E(T_1/T_2)$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 54	For testing $H_0: \theta = 4$ against $H_1: \theta \neq 4$ in population $N(\theta, 5)$, UMPU Critical region is :	एक प्रसाम्य समष्टि $N(\theta, 5)$ में $H_0: \theta = 4$ के विरुद्ध $H_1: \theta \neq 4$ के परीक्षण के लिये UMPU क्रिटिक क्षेत्र है:
A	$ \bar{x} \geq K$	$ \bar{x} \geq K$
B	$ \bar{x} \leq K$	$ \bar{x} \leq K$
C	$ \bar{x} \leq K$	$ \bar{x} \leq K$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 55	Let x_1, x_2, \dots, x_n be as random sample from population $N(\mu, \sigma^2)$, μ and σ^2 both are unknown. The unbiased estimator of σ^2 is :	माना x_1, x_2, \dots, x_n समष्टि $N(\mu, \sigma^2)$ से एक यादृच्छिक प्रतिदर्श है (μ तथा σ^2 दोनों अज्ञात हैं) तो σ^2 का अनभिनत आकलक है:
A	$\frac{1}{n} \sum x_i^2$	$\frac{1}{n} \sum x_i^2$
B	$\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$	$\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$
C	$\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$	$\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 56	For estimating mean of a distribution on the basis of a random sample $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, which one of the following is unbiased estimator ?	$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर बंटन के माध्य के आकलन हेतु अनभिनत आकलक निम्न में कौन है ?
A	$\frac{2}{n(n+1)} (x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n)$	$\frac{2}{n(n+1)} (x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n)$
B	$\frac{2}{n^2} (x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n)$	$\frac{2}{n^2} (x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n)$
C	$\frac{2}{n(n+1)} [x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \dots + \frac{1}{n}x_n]$	$\frac{2}{n(n+1)} [x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \dots + \frac{1}{n}x_n]$



D None of these

इनमें से कोई नहीं

Q.No: 57 A random sample x_1, x_2, \dots, x_n of size n is taken from the population whose pdf is $f(x) = (\alpha + 1)x^\alpha, 0 \leq x \leq 1$. The MLE of α is

एक n आकार का यादृच्छिक प्रतिदर्श x_1, x_2, \dots, x_n उस समष्टि से लिया गया है जिसका प्रायिकता घनत्व फलन $f(x) = (\alpha + 1)x^\alpha, 0 \leq x \leq 1$ है, α का अधिकतम संभविता आकलक है:

- A $\frac{n}{\sum_i \log x_i}$
 B $1 + \frac{n}{\sum_i \log x_i}$
 C $-1 + \frac{n}{\sum_i \log x_i}$
 D $-1 - \frac{n}{\sum_i \log x_i}$

- $\frac{n}{\sum_i \log x_i}$
 $1 + \frac{n}{\sum_i \log x_i}$
 $-1 + \frac{n}{\sum_i \log x_i}$
 $-1 - \frac{n}{\sum_i \log x_i}$

Q.No: 58 Let $\{X_j\}$ be a sequence of identically and independently distributed random variable with finite means and variance. Then for $\{X_j\}$,

माना $\{X_j\}$ एक परस्पर स्वतंत्र समान बंटन वाले यादृच्छिक चरों की श्रृंखला है, जिनके माध्य तथा प्रसरण परिमित हैं। $\{X_j\}$ के लिये:

- A Weak law of large numbers holds but central limit theorem does not
 B Central limit theorem holds but weak law of large numbers does not
 C Both weak law of large numbers and central limit theorem hold
 D None of these

- निर्बल बृहत् संख्या नियम सत्य है किन्तु केन्द्रीय सीमा प्रमेय नहीं
 केन्द्रीय सीमा प्रमेय सत्य है किन्तु निर्बल बृहत् संख्या नियम नहीं
 केन्द्रीय सीमा प्रमेय तथा निर्बल बृहत् संख्या नियम दोनों सत्य हैं
 इनमें से कोई नहीं

Q.No: 59 The point of intersection of two Ogives gives

दो तोरणों का कटान बिंदु प्रदान करता है:

- A Mean
 B Mode
 C Median
 D None of these

- माध्य
 बहुलक
 माध्यिका
 इनमें से कोई नहीं

Q.No: 60 When the total frequency of a distribution is increased indefinitely and class-intervals are made very small, the frequency polygon takes the following form :

जब किसी बंटन की कुल बारम्बारता बहुत बड़ा दी जाय तथा वर्ग अन्तराल बहुत छोटा कर दिया जाय तो बारम्बारता बहुभुज निम्न आकार धारण करता है:

A	Ogives	तोरण
B	Frequency curve	बारम्बारता वक्र
C	Histogram	आयतचित्र
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 61	The most appropriate diagram to represent the distribution of national plan outlay of a country in different sectors of economy is	किसी देश के राष्ट्रीय योजना परिसर का विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में बंटन को प्रदर्शित करने के लिये निम्न चित्र का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है:
A	Histogram	आयतचित्र
B	Frequency Polygon	बारम्बारता बहुभुज
C	Ogive	तोरण
D	Pie Chart	पाई चित्र

Q.No: 62	Which one of the following measure of central tendency remains unaffected by extreme observations?	निम्नलिखित में केन्द्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप चरम प्रेक्षकों से अप्रभावित रहती है ?
A	Arithmetic Mean	समानान्तर माध्य
B	Harmonic mean	हरात्मक माध्य
C	Median	माध्यिका
D	Geometric Mean	गुणोत्तर माध्य

Q.No: 63	The correlation coefficient between X and Y is $r = -1/2$. If regression coefficient $b_{yx} = -1/8$ then other regression coefficient b_{xy} is	X तथा Y के बीच सहसम्बन्ध गुणांक है $r = -1/2$. यदि समाश्रयण गुणांक $b_{yx} = -1/8$ हैं तो दूसरा समाश्रयण गुणांक b_{xy} है
A	-2	-2
B	-4	-4
C	2	2
D	4	4

Q.No: 64	For testing the independence of attributes in a contingency table, which one of the following test is used?	किसी आसन्न तालिका में गुणों की स्वतन्त्रता के परीक्षण हेतु निम्न में कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होता है ?
A	Chi-Square	काई-स्क्वायर
B	t	t



C	F	F
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 65	For testing that a bivariate sample has come from an uncorrelated bivariate Normal population. Which one of the following test is used?	इस परीक्षण हेतु कि एक द्विचरीय प्रतिदर्श किसी असम्बन्धित द्विचर प्रसामान्य सम्प्रति से लिया गया है, निम्न में किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है ?
A	Chi-Square	काई स्क्वायर
B	F	F
C	t	t
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 66	Let T be an unbiased estimator of θ . Then which one of the following is true?	यदि T, θ का अनभिनत आवलक है तो निम्न में कौन सत्य है ?
A	T^2 is unbiased for θ^2	T^2, θ^2 का अनभिनत आवलक है
B	\sqrt{T} is unbiased for $\sqrt{\theta}$	$\sqrt{T}, \sqrt{\theta}$ का अनभिनत आवलक है
C	$1/T$ is unbiased for $1/\theta$	$1/\theta, 1/T$ का अनभिनत आवलक है
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 67	The consistency of an estimator is:	आवलक की संगतता
A	Larger sample property only	केवल बृहत् प्रतिदर्श गुण है
B	Small sample property only	बृहत् अल्प प्रतिदर्श गुण है
C	Both Large and Small sample property	बृहत् तथा अल्प प्रतिदर्श गुण दोनों है
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 68	For Cauchy distribution with parameter θ , the consistent estimator of θ is	प्राचल θ के साथ का उष्मि बंटन के लिये, θ का संगत आवलक है:
A	Sample mean	प्रतिदर्श माध्य
B	Sample median	प्रतिदर्श माध्यिका
C	Sample mode	प्रतिदर्श बहुलक
D	None of these	इनमें से कोई नहीं



Q.No: 69	If the variance of an unbiased estimator attains the Cramer-Rao lower bound, the estimator is	यदि किसी अनभिनत आकलक का प्रसरण क्रेमर-राव न्यूनतम सीमा प्राप्त करता है तो आकलक है:
A	Consistent	संगत
B	Sufficient	पर्याप्त
C	Most efficient	दक्षतम
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 70	If a sufficient statistic exists for a parameter, the maximum likelihood estimator of that parameter is always :	यदि पर्याप्त प्रतिदर्शज किसी प्राचल के लिये है तो प्राचल का अधिकतम संभावित आकलक सदैव होता है
A	Unique	अद्वितीय
B	Unbiased	अनभिनत
C	Most efficient	दक्षतम
D	Sufficient	पर्याप्त

Q.No: 71	A UMP test for a simple null hypothesis against a composite alternative hypothesis:	सरल शून्य परिकल्पना को संयुक्त परिकल्पना के विरुद्ध परीक्षण के लिये एक समानतः अधिकतम सामर्थ्यवान परीक्षण
A	May or may not exist	प्राप्त हो सकता है और नहीं भी
B	Always exist	सदैव प्राप्त हो सकता है
C	Never exist	कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 72	It is proposed to test $H_0: \theta = 2$ against $H_1: \theta = 1$ on the basis of a single observation X from distribution $f(x) = \theta \exp(-\theta x); x \geq 0$. If critical region is $X > 1$, the value of probability of type I error is:	बंटन $f(x) = \theta \exp(-\theta x); x \geq 0$ से एक प्रेक्षण x पर आधारित $H_0: \theta = 2$ का $H_1: \theta = 1$ के विरुद्ध परीक्षण करना है। यदि क्रान्तिक क्षेत्र $x > 1$ है, तो प्रथम प्रकार की त्रुटि की प्रायिकता है।
A	e^2	e^2
B	$1/e^2$	$1/e^2$
C	$(e^2-1)/e$	$(e^2-1)/e$
D	$e/(e^2-1)$	$e/(e^2-1)$

Q.No: 73	The minimum variance unbiased estimator of θ in $U(0, \theta)$ is:	$U(0, \theta)$ में θ का न्यूनतम प्रसरण अनभिनत आकलक है:
----------	---	---



A	$\frac{n}{n+1} X_{(n)}$	$\frac{n}{n+1} X_{(n)}$
B	$\frac{n+1}{n} X_{(n)}$	$\frac{n+1}{n} X_{(n)}$
C	$X_{(n)}$	$X_{(n)}$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं है

<p>If X_1, X_2, \dots, X_{n+1} are independently and identically distributed $N(0,1)$ variables,</p> <p>Q.No: 74 then the distribution of $\frac{\sqrt{n} X_{n+1}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2}}$ is</p>		<p>यदि X_1, X_2, \dots, X_{n+1}, स्वतंत्र तथा समान रूप से बँटित $N(0,1)$ वर है, तो $\frac{\sqrt{n} X_{n+1}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n X_i^2}}$ का बँटन है:</p>
A	t	t
B	Chi-Square	काई-स्क्वायर
C	F	F
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

<p>Q.No: 75 For testing the 'goodness of fit' of a distribution. Which of the following test is used?</p>		<p>किसी बँटन के 'असंजन सुदृढता' के परीक्षण हेतु निम्न में किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है ?</p>
A	F	F
B	t	t
C	Z	Z
D	Chi-Square	काई-स्क्वायर

<p>Q.No: 76 In answering a question on a multiple choice test, an examinee either knows the answer with probability p or guesses with probability $(1-p)$. The probability of answering question correctly is one if he knows the answer and $1/m$ if he guesses. If an examinee answers a question correctly the probability that he really know the answer is</p>		<p>बहुविकल्प परीक्षण में एक प्रश्न के उत्तर देने में एक परीक्षार्थी या तो p प्रायिकता के साथ उत्तर जानता है या $(1-p)$ प्रायिकता के साथ अनुमान लगाता है। प्रश्न के सही उत्तर देने की प्रायिकता एक है यदि वह उत्तर जानता है तथा $1/m$ है यदि वह अनुमान लगाता है। यदि कोई परीक्षार्थी किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है तो वह सचमुच में उस उत्तर को जानता है, की प्रायिकता है:</p>
A	$\frac{mp}{1+mp}$	$\frac{mp}{1+mp}$
B		



	$\frac{mp}{1 + (m-1)p}$		$\frac{mp}{1 + (m-1)p}$
C	$\frac{(m-1)p}{1 + (m-1)p}$		$\frac{(m-1)p}{1 + (m-1)p}$
D	$\frac{(m-1)p}{1 + mp}$		$\frac{(m-1)p}{1 + mp}$

Q.No: 77 The relation between mean and variance of a chi square distribution is

- A **Mean = Variance**
- B **Mean = 2 Variance**
- C **Variance = 2 Mean**
- D **None of these**

काई स्क्वायर वितरण के माध्य तथा प्रसरण में सम्बंध है

- माध्य=प्रसरण
- माध्य = 2 प्रसरण
- प्रसरण = 2 माध्य
- इनमें से कोई नहीं

Q.No: 78 Least square estimators of parameters of a linear model are:

- A **Unbiased**
- B **Best linear unbiased**
- C **Uniformly minimum variance unbiased**
- D **All of these**

रैखिक मॉडल में प्राचलों के न्यूनतम वर्ग आकलक होते हैं

- अनभिनत
- श्रेष्ठतम रैखिक अनभिनत
- एक समान न्यूनतम प्रसरण अनभिनत
- इनमें से कोई नहीं

Q.No: 79 In a binomial distribution with parameters n and p, the coefficient of skewness is zero if

- A **P = 1/2**
- B **P > 1/2**
- C **P < 1/2**
- D **None of these**

द्विपद वितरण, जिसके प्राचल n तथा p हैं, का विषमता गुणांक शून्य होता है यदि

- P = 1/2
- P > 1/2
- P < 1/2
- इनमें से कोई नहीं

Q.No: 80 Degrees of freedom is related to

- A **Number of observations in the set**
- B **Hypothesis under test**

स्वतंत्र कोटि सम्बन्धित होती है:

- सेट में दिये प्रेक्षणों की संख्या पर
- परीक्षण में परिकल्पना पर



C	Number of linearly independent observations in the set	सेट में दिये देखिक रूप से स्वतन्त्र प्रेक्षणों की संख्या पर
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 81	Let X and Y be two independent variables with variances σ_1^2 and σ_2^2 respectively. Then, correlation coefficient between X and (X-Y) is:	माना X तथा Y दो स्वतंत्र चर हैं जिनका प्रसरण क्रमशः σ_1^2 तथा σ_2^2 है। तब X तथा (X-Y) के मध्य सह सम्बन्ध गुणांक है
A	$\frac{\sigma_2}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$	$\frac{\sigma_2}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$
B	$\frac{\sigma_1}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$	$\frac{\sigma_1}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$
C	$\frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$	$\frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 82	Let $M_x(t)$ be moment generating function of a random variable X about origin. Then, moment generating function of $Y = \{(X/3) + 4\}$ about origin is	माना $M_x(t)$ यादृच्छिक चर X का शून्य के सापेक्ष आघूर्णजनक फलन है। तब $Y = \{(X/3) + 4\}$ का शून्य के सापेक्ष आघूर्ण जनक फलन है
A	$M_y(t) = M_x(t/3)$	$M_y(t) = M_x(t/3)$
B	$M_y(t) = M_{3x}(t) e^{4t}$	$M_y(t) = M_{3x}(t) e^{4t}$
C	$M_y(t) = M_x(t/3) e^{4t}$	$M_y(t) = M_x(t/3) e^{4t}$
D	$M_y(t) = M_{3x}(t) e^{t/4}$	$M_y(t) = M_{3x}(t) e^{t/4}$

Q.No: 83	If X has exponential distribution with mean $1/\lambda$ then $\frac{P_r(X \geq 2x)}{P_r(X \geq 3x)}$ is:	यदि X का बंटन चर घातीय है, जिसका माध्य $1/\lambda$ है, तो $\frac{P_r(X \geq 2x)}{P_r(X \geq 3x)}$ का मान है
A	$e^{-\lambda x}$	$e^{-\lambda x}$
B	$e^{\lambda x}$	$e^{\lambda x}$
C	$e^{-x/\lambda}$	$e^{-x/\lambda}$
D	$e^{x/\lambda}$	$e^{x/\lambda}$



Q.No: 84	The distribution which possesses 'memory less property' is	वह बंटन जिसमें स्मृति रहित गुण होता है:
A	Geometric	ज्यामितीय
B	Gamma	गामा
C	Hyper geometric	हाईपर ज्यामितीय
D	All of these	सभी सही है

Q.No: 85	With the help of Ogive curve, which of the following can be determined?	तोरण वक्र से निम्न में से किसकी गणना की जा सकती है ?
A	Median	माध्यिका
B	Deciles	दशांक
C	Percentiles	शतांक
D	All of these	सभी सही है

Q.No: 86	A negative correlation between anxiety before test and the performance there in, indicates that	किसी परीक्षण से पहले की चिंता तथा परीक्षण में प्रदर्शन के बीच ऋणात्मक सहसम्बन्ध दर्शाता है:
A	More the anxiety the better is the performance	जितनी अधिक चिंता उतना अच्छा प्रदर्शन
B	Lesser the anxiety better is the performance	जितनी कम चिंता उतना अच्छा प्रदर्शन
C	Lesser the anxiety lesser is the performance	जितनी कम चिंता उतना खराब प्रदर्शन
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 87	Simple random sample can be drawn with the help of :	सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श निम्न में किसकी सहायता से लिया जा सकता है ?
A	Random Number Table	यादृच्छिक संख्या सारिणी
B	Chit method	चिट विधि
C	Roulett Wheel	रौलेट चक्र
D	All of these	सभी सही है

Q.No: 88	If F value for treatments in ANOVA comes out to be less than unity, it may be due to	यदि प्रसरण विश्लेषण में कारको के लिए F का मान एक से कम आता है तो इसका कारण हो सकता:
A	Improper Randomisation	गलत यादृच्छिकता
B	Non-normality	प्रसामान्यता का न होना
C	Selecting a wrong statistical model	गलत सांख्यिकी आब्यूड का चुनाव



D	All of these	सभी सही हैं
---	--------------	-------------

Q.No: 89	To select team for an inter collegiate Quiz Competition, which of the following sampling technique is most appropriate?	विभिन्न कालेज के बीच होने वाली पहली प्रतियोगिता के लिये टीम चुनने में निम्न में कौन सी प्रतिचयन विधि सबसे उचित है ?
A	Quota Sampling	कोटा प्रतिचयन
B	Stratified Sampling	स्तरित प्रतिचयन
C	Purposive sampling	उद्देश्यीय प्रतिचयन
D	Simple Random Sampling	सरल यादृच्छिक प्रतिचयन

Q.No: 90	In sampling with probability proportional to size, the units are selected with probability proportional to	प्रतिचयन विधि जिसमें प्रायिकता आकार के अनुपात में है, इकाइयाँ चुनी जाती हैं उस प्रायिकता के साथ जो अनुपात में होती है
A	Size of sample	प्रतिचयन आकार के
B	Size of population	समष्टि आकार के
C	Size of unit	इकाई आकार के
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 91	When calculating the average rate of debt expansion for a company, which one of the following mean is most appropriate?	किसी कम्पनी की ऋण वृद्धि के माध्य की गणना करने के लिये, निम्न में कौन सा माध्य सबसे उचित है ?
A	Geometric Mean	गुणोत्तर माध्य
B	Arithmetic mean	समानान्तर माध्य
C	Harmonic mean	हरात्मक माध्य
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 92	Let X and Y be two independent binomial $b(n, p)$ variates, which one of the following is true?	माना X तथा Y दो स्वतंत्र द्विपद $b(n, p)$ चर हैं। निम्न में कौन सत्य है।
A	$E(X+Y) > V(X+Y)$	$E(X+Y) > V(X+Y)$
B	$E(X+Y) < V(X+Y)$	$E(X+Y) < V(X+Y)$
C	$E(X) = V(Y)$	$E(X) = V(Y)$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं



Q.No: 93	The difference between a statistic and the corresponding parameter is said to be:	प्रतिदर्शज तथा उसके प्राचल के बीच के अन्तर को कहते हैं:
A	Standard error	मानक त्रुटि
B	Sampling error	प्रतिचयन त्रुटि
C	Both (Standard) and (Sampling error)	दोनों (प्रतिचयन त्रुटि) तथा (प्रतिचयन त्रुटि)
D	Neither (Standard) nor (Sampling error)	न (मानक त्रुटि) न (प्रतिचयन त्रुटि)

Q.No: 94	The target population is another way of describing	लक्ष्य समष्टि निम्न में किसको बताने का दूसरा तरीका है ?
A	Survey Population	सर्वे समष्टि
B	Main Sample	मुख्य प्रतिचयन
C	The population for which results are required	वह समष्टि जिसके परिणाम अपेक्षित हैं
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 95	A sample survey is to be conducted to estimate the average size of land holdings of house holds in a district. Which one of the following will be most appropriate procedure of sampling?	एक जिले के परिवारों के जोतों का औसत क्षेत्रफल आकलित करना है। निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी?
A	Simple Random Sampling	सरल यादृच्छिक प्रतिचयन
B	Stratified Random Sampling	स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन
C	Systematic Sampling	क्रमबद्ध प्रतिचयन
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 96	For a $m \times m$ latin square design, the degree of freedom for error is:	$m \times m$ लैटिन वर्ग अभिकल्प में त्रुटि के हिये स्वतंत्र कोटि होती है:
A	$m^2 - 1$	$m^2 - 1$
B	$(m-1)^2$	$(m-1)^2$
C	$m(m-1)$	$m(m-1)$
D	$(m-1)(m-2)$	$(m-1)(m-2)$

Q.No: 97	In 2^3 factorial experiment, the number of two factor interaction is	2^3 बहुउपादानी प्रयोग में 2 उपारान अन्योन्य क्रिया की संख्या होगी
A	2	2
B	3	3



C	4	4
D	8	8

Q.No: 98	In a randomised block design there are 5 treatments and 20 plots. Then the number of replications for third treatment will be:	एक यादृच्छिक खंडक अभिकल्प में 20 भूखण्ड तथा 5 उपचार हैं। तो तृतीय उपचार की पुनरावृत्ति की संख्या होगी ?
A	3	3
B	4	4
C	5	5
D	19	19

Q.No: 99	In a 2^3 factorial experiment, the treatment contract (1) $-a-b+c+ab-ac-bc+abc$ belongs to the effect:	एक 2^3 बहुउपादानी प्रयोग में उपचार विपर्यास (1) $-a-b+c+ab-ac-bc+abc$ जो प्रभाव निरूपित करता है, वह है:
A	AC	AC
B	BC	BC
C	AB	AB
D	ABC	ABC

Q.No: 100	Completely Randomised design is based on the principles of :	पूर्णतः यादृच्छिकीकृत अभिकल्प निम्न सिद्धांतों पर आधारित है:
A	Replication Randomisation and local control	पुनरावृत्ति, यादृच्छिकीकरण एवं स्थानीय नियन्त्रण
B	Replication and Randomisation only	केवल पुनरावृत्ति एवं यादृच्छिकीकरण
C	Randomisation and local control only	केवल यादृच्छिकीकरण एवं स्थानीय नियन्त्रण
D	Replication and local control only	केवल पुनरावृत्ति एवं स्थानीय नियन्त्रण

Q.No: 101	A ratio estimator gives higher precision if	एक अनुपात आवलक अधिक दक्षता देता है यदि
A	Regression line of Y on X passes through origin	समाश्रयण रेखा Y की X पर मूल बिन्दु से जाती है
B	Regression of Y on X is linear	समाश्रयण रेखा Y की X पर एक घातीय है
C	Both (Regression line of Y on X passes through origin) and (Regression of Y on X is linear) hold	दोनों (समाश्रयण रेखा Y की X पर मूल बिन्दु से जाती है) तथा (समाश्रयण रेखा Y की X पर एक घातीय है) हों
D	Neither (Regression line of Y on X passes through origin) nor (Regression of Y on X is linear) necessary	न (समाश्रयण रेखा Y की X पर मूल बिन्दु से जाती है) न (समाश्रयण रेखा Y की X पर एक घातीय है) आवश्यक है



Q.No: 102	In simple random sampling without replacement the probability that a particular unit is selected at t^{th} draw, is:	पुनर्स्थापन रहित सरल यादृच्छिक प्रतिचयन में किसी दी गई इकाई के t वें चुनाव में चयन की प्रायिकता होती है:
A	r/N	r/N
B	$1/N-r$	$1/N-r$
C	$1/(N-r+1)$	$1/(N-r+1)$
D	$1/N$	$1/N$

Q.No: 103	In a 2^3 factorial experiment the contribution of any effect (A) to the sum of squares for treatment is	एक 2^3 बहुउपादानी प्रयोग में किसी उपाचार (A) का उपचार वर्ग योग में योगदान देता है:
A	$[A]^2/6r$	$[A]^2/6r$
B	$[A]^2/2r$	$[A]^2/2r$
C	$[A]^2/8r$	$[A]^2/8r$
D	$[A]^2/4r$	$[A]^2/4r$

Q.No: 104	A population consisting of 50 units is divided into two strata such that $N_1=30$, $N_2=20$, $S_1=2$, $S_2=3$ If by Neyman Allocation, $n_1 = 6$ the sample size is	एक समष्टि जिसमें 50 इकाइयाँ हैं, दो स्तरों में विभाजित इस तरह से हैं कि $N_1=30$, $N_2=20$, $S_1=2$, $S_2=3$ यदि नेमन आवंटन से $n_1 = 6$ है तो प्रतिदर्श आकार का मान है:
A	6	6
B	12	12
C	25	25
D	30	30

Q.No: 105	Which of the following statements is true in the context of randomised block design	यादृच्छिकीकृत खण्ड अधिकल्पना से सम्बन्धित निम्न कथनों में कौन सा सत्य है ?
A	The blocks are made in the direction perpendicular to route of fertility variation	विभिन्न खण्ड, उर्वरता परिवर्तन की दिशा की लम्बवत् दिशाओं में बनाये जाते हैं।
B	The design controls experimental error in both the directions of experimental field	यह अधिकल्पना प्रयोगिक क्षेत्र की दोनों दिशाओं में प्रयोगिक त्रुटि को नियन्त्रित करती है।
C	In this design the number of treatments of replications	इस अधिकल्पना में अनिवार्यतः उपचारों की संख्या पुनरावृत्तियों की संख्या के समान होती है।
D	Only the principles of randomisations and replications are used in this design	इसमें मात्र यादृच्छिकीकरण तथा पुनरावृत्ति सिद्धांतों का उपयोग होता है।



Q.No: 106	A 2^3 factorial experiment is to be conducted in a randomised block design. If degrees of freedom of error is to be kept 14, the number of blocks required is:	एक 2^3 बहुउपादनी प्रयोग एक यादृच्छिकीकृत खंडक अभिकल्प में किया जाना है। यदि प्रयोगिक त्रुटि की स्वातंत्र्य कोटि 14 रखनी है तो खण्डक की संख्या होनी चाहिये
A	2	2
B	3	3
C	4	4
D	5	5

Q.No: 107	From a population whose units are valued 5, 4, 3, 2, 1 a simple random sample of size 2 is taken without replacement. The standard error of its sample mean is	किसी समष्टि जिसकी इकाइयों का मान 5, 4, 3, 2, 1 है से 2 आकार का एक प्रतिदर्श, प्रतिस्थापन रहित सरल यादृच्छिक विधि से लिया जाता है। इस प्रतिदर्श के माध्य की मानक त्रुटि है:
A	$\sqrt{0.6}$	$\sqrt{0.6}$
B	$\sqrt{0.75}$	$\sqrt{0.75}$
C	$\sqrt{0.85}$	$\sqrt{0.85}$
D	1	1

Q.No: 108	For estimating the population proportion P by a simple random sample without replacement, let p be the sample proportion. The value of $V(p)$ is	माना कि प्रतिस्थापन रहित एक सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा समष्टि अनुपात P के आकलन के लिए प्रतिदर्श अनुपात p है। $V(p)$ का मान है:
A	$PQN/n(N-1)$	$PQN/n(N-1)$
B	$PQ(N-n)/(n-1)N$	$PQ(N-n)/(n-1)N$
C	$P(N-n)/Q(N-1)$	$P(N-n)/Q(N-1)$
D	$PQ(N-n)/n(N-1)$	$PQ(N-n)/n(N-1)$

Q.No: 109	In stratified random sampling optimum allocation reduces to proportional allocation when strata have	स्तरीय यादृच्छिक प्रतिचयन में इष्टतम वितरण समानुपाती वितरण हो जाता है जबकि स्तरों में
A	Equal size and equal standard deviation	बराबर इकाइयों तथा बराबर मानक विचलन हो
B	Equal standard deviation and equal per unit cost	बराबर मानक विचलन तथा बराबर मानक विचलन हो
C	Equal standard deviation	बराबर मानक विचलन हो
D	None of these	इनमें से कोई नहीं



Q.No: 110 In 2^3 factorial experiment with 5 blocks, the degrees of freedom of error is

- A 4
- B 9
- C 16
- D 28

पाँच खण्डों वाले एक 2^3 बहुउपदानी प्रयोग में त्रुटि की स्वातंत्र्य कोटि है।

- 4
- 9
- 16
- 28

Using standard notations given that
Stratum W_i S_i
Q.No: 111 1 0.8 2
2 0.2 4
The Neyman allocation of a sample of size 12 will be

- A (4,8)
- B (6,6)
- C (8,4)
- D None of these

मानक संकेतों में दिया है:
Stratum W_i S_i
1 0.8 2
2 0.2 4
तो 12 आकार वाले प्रतिदर्श का नीमन नियतन होगा

- (4,8)
- (6,6)
- (8,4)
- इनमें से कोई नहीं

Q.No: 112 Let the degrees of freedom for error sum of squares is 6. Then the order of the Latin square is :

- A 3 X 3
- B 4 X 4
- C 5 X 5
- D 6 X 6

माना कि एक लेटिन वर्ग अधिकल्पना में त्रुटि वर्ग योग की स्वातंत्र्य कोटि 6 है तो लेटिन वर्ग का आकार है:

- 3 X 3
- 4 X 4
- 5 X 5
- 6 X 6

Q.No: 113 The statistic $T = \sum_{i=1}^k \left\{ \frac{(0_i - e_i)^2}{e_i} \right\}$ follows

- A Chi-square distribution with $(k-1)$ df
- B Chi-square distribution with k df
- C Chi-square distribution unit $(k+1)$ df

प्रतिदर्श $T = \sum_{i=1}^k \left\{ \frac{(0_i - e_i)^2}{e_i} \right\}$ का बंटन होता है:

- काई स्क्वायर $(k-1)$ स्वातंत्र्य कोटि का
- काई स्क्वायर k स्वातंत्र्य कोटि का
- काई स्क्वायर $(k+1)$ स्वातंत्र्य कोटि का

D	None of these	इनमें से कोई नहीं
---	---------------	-------------------

Q.No: 114	If X_1 , X_2 and X_3 are mutually independent standard normal variates, then the variance of $(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2)$ is:	यदि X_1 , X_2 तथा X_3 परस्पर स्वतंत्र मानक प्रसामान्य चर हैं तो $(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2)$ का प्रसरण है:
A	2	2
B	3	3
C	6	6
D	12	12

Q.No: 115	Let X be a chi-square variate with 5 degrees of freedom. Then $E(X^2)$ is	माना X एक 5 स्वातंत्र कोटि का काई वर्न चर है तो $E(X^2)$ का मान है:
A	50	50
B	35	35
C	10	10
D	5	5

Q.No: 116	In stratified sampling you take a larger sample from the stratum if	स्तरित प्रतिचयन में आप एक स्तर से बड़ा प्रतिदर्श लेंगे यदि
A	Stratum is larger	स्तर बड़ा हो
B	Stratum is more variable internally	स्तर में आन्तरिक विविधता अधिक हो
C	Sampling is cheaper in the stratum	स्तर में प्रतिचयन सस्ता हो
D	All of these	सभी सही हैं

Q.No: 117	The principle of local control is used to	स्थानीय नियंत्रण सिद्धांत का प्रयोग निम्न हेतु करते हैं:
A	Reduce error variance	त्रुटि प्रसरण कम करना
B	Reduce the number of replications	पुनरावृत्ति संख्या कम करना
C	Increase the number of plots	भूखण्डों की संख्या बढ़ाना
D	Reduce the degrees of freedom	स्वातंत्र कोटि कम करना

Q.No: 118	A completely randomised design is treated as a	पूर्णतया यादृच्छिकीकृत अभिकल्पना का रूप है:
-----------	--	---



A	One way classification	एकधा वर्गीकरण
B	Two way classification	द्विधा वर्गीकरण
C	Three way classification	त्रिधा वर्गीकरण
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 119	In a randomised block design, we always have	यादृच्छिक खण्डक अभिकल्पना में सदैव
A	Number of blocks = number of treatments	खण्डकों की संख्या = उपचारों की संख्या
B	Number of blocks < number of treatments	खण्डकों की संख्या < उपचारों की संख्या
C	Number of blocks > number of treatments	खण्डकों की संख्या > उपचारों की संख्या
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 120	In a R.B.D which test is used for testing the equality of any two treatment means?	यादृच्छिक खण्डक अभिकल्पना में किन्हीं दो उपचारों के माध्य की समानता परीक्षण के लिये किस परीक्षण का प्रयोग होता है ?
A	F-test	F परीक्षण
B	t-test	t परीक्षण
C	Chi-square test	काई वर्ग परीक्षण
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 121	The degree of freedom of F-ratio in a 5 x 5 latin square design are:	5 x 5 लैटिन वर्ग अभिकल्पना में F- अनुपात का स्वातंत्र्य कोटि होता है:
A	(4,8)	(4,8)
B	(5,8)	(5,8)
C	(4,12)	(4,12)
D	(5,12)	(5,12)

Q.No: 122	If the degrees of freedom of error sum of squares in a Latin square design is 20. The number of rows is	किसी लैटिन वर्ग अभिकल्पना में त्रुटि वर्ग योग की स्वातंत्र्य कोटि 20 है। पंक्तियों की संख्या है:
A	7	7
B	6	6
C	5	5



D

4

4

Q.No: 123

In a randomised block design with 4 blocks, 6 treatments and one observation is missing. Then its error degree of freedom is

A

17

B

16

C

15

D

14

एक यादृच्छिकीकृत खण्डक अभिकल्प में 4 खण्ड, 6 उपचार हैं तथा एक प्रेक्षक लुप्त है। तब इसकी त्रुटि की स्वातंत्र्य कोटि है;

17

16

15

14

Q.No: 124

The layout of three treatments A,B,C is given as

A B C

B A C

C C B

It represents :

A

Latin Square design

B

2³ factorial experiment

C

Randomised block design

D

Completely randomized design

A,B,C तीन उपचारों का निम्न अभिन्यास दिया है:

A B C

B A C

C C B

यह संरचना किस अभिकल्प को दर्शाता है ?

लैटिन वर्ग अभिकल्प

2³ बहुउपादानी अभिकल्प

यादृच्छिकीकृत खण्डक अभिकल्प

पूर्णतया यादृच्छिकीकृत अभिकल्प

Q.No: 125

Considered the following table

Source	d.f	SS
Treatment	3	5
Block	4	25
Error	X	Y
	Z	40

The values of X,Y and Z respectively are

A

4,11,10

B

12,10,19

C

14,21,10

निम्न सारणी पर विचार कीजिये:

स्त्रोत	स्वातंत्र्य कोटि	वर्गयोग
उपचार	3	5
खण्डक	4	25
त्रुटि	X	Y
योग	Z	40

X,Y तथा Z के मान हैं क्रमशः

4,11,10

12,10,19

14,21,10



D	None of these	इनमें से कोई नहीं
---	---------------	-------------------

Q.No: 126	With usual notations, efficiency of cluster sampling in relation to simple random sampling is approximately the reciprocal of the following	यिन्हीं के सामान्य अर्थों में गुच्छ प्रतिचयन की दक्षता सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि के सापेक्ष निम्न में लगभग किसके व्युत्क्रम के बराबर होती है ?
A	$1+M\rho$	$1+M\rho$
B	$1+(M-1)\rho$	$1+(M-1)\rho$
C	$1+(M+1)\rho$	$1+(M+1)\rho$
D	$(1+M)\rho$	$(1+M)\rho$

Q.No: 127	A population consisting of 100 units is divided into two strata such that $N_1=60$, $N_2=40$, $S_1=2$ and $S_2=3$. If by Neyman Allocation $n_1=12$, the sample size n is:	एक समष्टि जिसमें 100 इकाइयाँ हैं को दो स्तरों में इस प्रकार बाँटा गया है कि $N_1=60$, $N_2=40$, $S_1=2$ तथा $S_2=3$ यदि नेमन नियतन से $n_1=12$ है तो प्रतिचयन अमाप है:
A	24	24
B	12	12
C	6	6
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 128	The randomised block design is preferred to completely randomised design when:	यादृच्छिकीकृत खण्डक अभिकल्प को पूर्णतया यादृच्छिकीकृत अभिकल्प पर वरीयता दी जाती है जब:
A	Treatments are heterogeneous	कारक विषम है
B	Experimental units are heterogeneous	प्रयोगिक इकाइयाँ विषम है
C	Number of replications are equal for treatments	कारकों की पुनरावृत्ति संख्या बराबर है
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 129	In a 5X5 latin square design having one observation missing, the totals of row, column and treatment having the missing observations are 25, 40, 35 respectively and the grand total is 100. The estimate of missing observations is :	किसी 5X5 लैटिन वर्ग अभिकल्पना में एक प्रेक्षण लुप्त है। लुप्त प्रेक्षण वाले पंक्ति, स्तम्भ तथा उपचार योग क्रमशः 25, 40, 35 है तथा पूर्ण योग 100 है। तब लुप्त प्रेक्षण का आकलन है :
A	30	30
B	15	15
C	20	20
D	25	25



Q.No: 130	300 units of a population are divided into two strata with $N_1=100$, $N_2=200$, $S_1=2$, $S_2=3$. If a sample of size 20 have to be selected by Neyman's Allocation, the two sizes from strata are respectively	किसी समष्टि को जिसमें 300 इकाइयाँ हैं, को दो स्तरों में इस प्रकार बाँटा गया है कि $N_1=100$, $N_2=200$, $S_1=2$, $S_2=3$ यदि 20 अमाप का प्रतिदर्श चुनना है तो नेमन नियतन से दो स्तरों से चुने गये प्रतिदर्शों का अमाप क्रमशः है:
A	(8, 12)	(8, 12)
B	(12, 8)	(12, 8)
C	(5, 15)	(5, 15)
D	(15, 5)	(15, 5)

Q.No: 131	An unbiased estimator of population proportion of male in a City is p . Which is based on simple random sampling without replacement. N and n are respectively population and sample sizes. Then an unbiased estimator of variance of p is $c p(1-p)$ when c is equal to	किसी शहर के आदमियों के समष्टि अनुपात का अनभिनत आकलन p है जो स्थापन रहित सरल यादृच्छिक विधि पर आधारित है। N तथा n क्रमशः समष्टि तथा प्रतिदर्श अमाप हैं। p के प्रसरण का अनभिनत आकलन $c p(1-p)$ तब है जब c का मान है:
A	$\frac{N-n}{N(n-1)}$	$\frac{N-n}{N(n-1)}$
B	$\frac{N-n}{Nn}$	$\frac{N-n}{Nn}$
C	$\frac{N-n}{(N-1)n}$	$\frac{N-n}{(N-1)n}$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 132	In a randomised block design there are 6 treatments 5 replications. The following is given Mean sum of squares due to replication = 20 Mean sum of squares due to treatment = 20 Total sum of squares = 220 Then, mean sum squares due to error is:	एक यादृच्छिकीकृत खण्डक अभिकल्पना में 6 कारक हैं तथा प्रत्येक की पुनरावृत्ति की संख्या 5 है। निम्न दिया है: पुनरावृत्ति वर्ग योग का माध्य = 20 कारक वर्ग योग का माध्य = 20 कुल वर्ग योग = 220 तब त्रुटि के वर्ग योग का माध्य है:
A	40	40
B	20	20
C	4	4
D	2	2



Q.No: 133	In a bivariate population the two regression lines are perpendicular to each other. When correlation coefficient r between the two variables is :	एक द्विचर समष्टि में दो समाश्रयन रेखाएँ एक दूसरे के लम्बवत होती हैं जब दोनों चरों के बीच सहसम्बन्ध गुणांक r का मान होता है:
A	$r = 1$	$r = 1$
B	$r = 0$	$r = 0$
C	$r = -1$	$r = -1$
D	$0 < r < 1$	$0 < r < 1$

Q.No: 134	For controlling quality of items in a production process where number of defects per item are counted. Which one of the following charts is used?	किसी उत्पादन प्रक्रिया में वस्तुओं के गुणता नियन्त्रण के लिये परीक्षा हेतु चुने हुये समूह में प्रत्येक वस्तु में दोष की संख्या के लिये निम्न में किस चार्ट (या चित्र) का प्रयोग किया जाता है?
A	Mean Chart	माध्य चित्र
B	R Chart	R चित्र
C	p Chart	P चित्र
D	C Chart	C चित्र

Q.No: 135	CUSUM Chart is especially useful for detection of	CUSUM चित्र (या चार्ट) निम्न में किसके संशोधन के लिये विशेष रूप से उपयुक्त है ?
A	Small process shifts	छोटी प्रक्रिया बदलाव
B	Large process shifts	बड़ी प्रक्रिया बदलाव
C	Nonrandom patterns	यादृच्छिक रहित रीति
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 136	A double sampling plan is	द्विप्रतिचयन योजना
A	Equally efficient as a single sampling plan	एकल प्रतिचयन योजना के समान दक्ष होती है
B	Usually more efficient than a single sampling plan	एकल प्रतिचयन योजना की अपेक्षा साधारणतः अधिक दक्ष होती है
C	Never more efficient than a single sampling plan	एकल प्रतिचयन योजना की अपेक्षा कभी नहीं अधिक दक्ष होती है
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 137	Which of the following distribution is used to construct p-Chart?	निम्न में किस बंटन का प्रयोग p चित्र बनाने में किया जाता है ?
A	Binomial	द्विपद
B	Normal	प्रसामान्य



C	Poisson	पॉइसॉ
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 138	Process control is carried out:	प्रक्रिया नियन्त्रण को किया जाता है
A	Before production	उत्पादन से पहले
B	After production	उत्पादन के बाद
C	During production	उत्पादन के समय
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 139	If the price index for the year 2015 is 110.3 and the price index for the year 2005 is 98.4 then upto two decimal places, the purchasing power of money (in ₹) of 2005 compared to 2015 is	यदि 2015 में मूल्य सूचकांक 110.3 तथा 2005 में मूल्य सूचकांक 98.4 है तो दशमलव का दो स्थानों तक, रुपये की क्रय क्षमता: 2005 में 2015 के सापेक्ष होगी
A	1.12	1.12
B	1.25	1.25
C	1.35	1.35
D	0.89	0.89

Q.No: 140	If the linear trend for the number of footballs sold per year at a shop is given by equation $Y=20+135t$ (the base period is 2008), then the forecast for number of footballs to be sold in 2018 will be	एक दुकानदार द्वारा बेची गयी फुटबालों की प्रतिवर्ष संख्या की रेखीय उपपत्ति को निम्न रेखा प्रदर्शित करती है: $Y=20+135t$ (यहाँ आधार वर्ष 2008 को माना गया है) तो उसके द्वारा 2018 में बेची जाने वाली फुटबालों का पूर्वानुमान होगा:
A	1150	1150
B	1370	1370
C	1550	1550
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 141	Which control Chart utilizes Poisson distribution for during its control limits?	किस नियन्त्रण चित्र में नियन्त्रण सीमाओं को प्राप्त करने के लिये पॉइसॉ बंटन को प्रयुक्त किया जाता है ?
A	p - chart	p - चित्र
B	np - chart	np - चित्र
C	c - chart	c - चित्र
D	(\bar{X}, σ) chart	(\bar{X}, σ) चित्र



Q.No: 142	If the random variable X follows exponential distribution with mean 10 then $P[X > 10/X > 5]$ is	यदि यादृच्छिक चर X का बंटन माध्य 10 वाला चरघाताकी बंटन है तो $P[X > 10/X > 5]$ होगी
A	\sqrt{e}	\sqrt{e}
B	$1/\sqrt{e}$	$1/\sqrt{e}$
C	e	e
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 143	Index number I satisfies circular test if	सूचकांक I चक्रीय परीक्षण को सन्तुष्ट करता है यदि
A	$I_{ab} I_{bc} = I_{ac}$	$I_{ab} I_{bc} = I_{ac}$
B	$I_{ab} I_{bc} I_{cd} = 1$	$I_{ab} I_{bc} I_{cd} = 1$
C	$I_{ab} I_{bc} I_{cd} I_{da} = 1$	$I_{ab} I_{bc} I_{cd} I_{da} = 1$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 144	In Marshall-Edgeworth index number the weight used is:	मार्शल-एजवर्थ सूचकांक में प्रयुक्त भार है:
A	$\frac{q_0 + q_1}{2}$	$\frac{q_0 + q_1}{2}$
B	$\sqrt{q_0 q_1}$	$\sqrt{q_0 q_1}$
C	$p_0 q_0$	$p_0 q_0$
D	$p_1 q_1$	$p_1 q_1$

Q.No: 145	The secular trend of a time series is measured by	किसी काल श्रेणी में दीर्घकालीन उपनति ज्ञात करने की विधि है:
A	Link Relative Method	अपेक्षिक श्रृंखला विधि
B	Moving Averages	गतिमान माध्य
C	Variate Difference Method	चर अन्तर विधि
D	Periodogram Analysis	पीरियोग्राम विश्लेषण



Q.No: 146	If the average annual probability of dying between exact ages 20 and 30 years is 0.001, the value of l_{30}/l_{20} is	यदि 20 तथा 30 वर्ष की सही उम्रों के मध्य मृत्यु की औसत वार्षिक प्रायिकता 0.001 है तो l_{30}/l_{20} का मान है:
A	0.999	0.999
B	0.99	0.99
C	0.90	0.90
D	0.001	0.001

Q.No: 147	In a life table, generally the value of radix (l_0) is taken to be	सामान्यतः किसी जीवन सारणी में मूलान्क (l_0) को लिया जाता है:
A	1	1
B	10000	10000
C	100000	100000
D	1000000	1000000

Q.No: 148	In a life table, for calculation of expectancy of life at age x , we use the formula:	किसी जीवन सारणी में उम्र x पर जीवन प्रत्याशा की गणना करने के लिये हम किस सूत्र को प्रयोग में लाते हैं ?
A	$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$	$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$
B	$e_x^0 = \frac{T_x}{L_x}$	$e_x^0 = \frac{T_x}{L_x}$
C	$e_x^0 = \frac{L_x}{L_x + 1}$	$e_x^0 = \frac{L_x}{L_x + 1}$
D	$e_x^0 = T_x L_x$	$e_x^0 = T_x L_x$

Q.No: 149	The sum of annual age-specific fertility rates over the whole reproduction ages is known as	सम्पूर्ण जननीय उम्रों पर वार्षिक उम्र-विशेष उर्वरता दरों के योग को कहते हैं:
A	General fertility rate	सामान्य उर्वरता दर
B	Crude birth rate	अशुद्ध जन्म दर
C	Total fertility rate	कुल उर्वरता दर
D	Net reproduction rate	शुद्ध पुनरुत्पादन दर



Q.No: 150. A human population will have a tendency to increase in size of net reproduction rate is

एक मानव समष्टि आकार में बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है यदि शुद्ध पुनरुत्पादन दर

- A Greater than 1
- B Less than 1
- C Equal to 1
- D Zero

- 1 से अधिक है
- 1 से कम है
- 1 के बराबर है
- शून्य है

Q.No: 151. Periodogram analysis is a method of determining

पीरियोग्राम विश्लेषण किसको जानने की एक विधि है ?

- A Seasonal variation
- B Cyclical variation
- C Random component
- D Secular trend

- मौसमी विविधता
- चक्रीय विविधता
- मातृच्छिक अवयव
- दीर्घकालिक उपनति

Q.No: 152. Fisher's Z transformation is used when we wish to test the equality of

फिशर के Z रूपान्तर का उपयोग तब किया जाता है जब हम निम्नलिखित का समानता की परीक्षण करना चाहते हैं

- A Variances of k populations
- B Means of k populations
- C Skewness of two populations
- D Correlation coefficients of k populations

- k समष्टियों के प्रसरणों का
- k समष्टियों के माध्यों का
- दो समष्टियों की विषमता का
- k समष्टियों के सहसम्बन्ध गुणांकों का

The following table gives the frequency distribution of number of live births born to women in the age group 15-45 years

Age group	Number of women	Number of live births
15-19	20000	600
20-24	18000	1200
25-29	14000	800
30-35	8000	96

Q.No: 153

The value of General Fertility Rate (GFR) based on the above data is:

15 से 45 वर्ष की महिलाओं द्वारा जन्मे बच्चों का निम्न बारबार बंटन है:

वर्ष समूह	महिलाओं की संख्या	जन्मे बच्चों की संख्या
15-19	20000	600
20-24	18000	1200
25-29	14000	800
30-45	8000	96

उपरोक्त के आधार पर सामान्य उर्वरता दर है:

A	44.933	44.933
B	89.866	89.866
C	449.33	449.33
D	898.66	898.66

Q.No: 154	Consumer price index numbers reveal the state of	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर्शाता है। स्थिति
A	Inflation only	मात्र मुद्रा स्फीति की
B	Deflation only	मात्र मुद्रा हास की
C	Both (Inflation only) and (Deflation only)	दोनों (मात्र मुद्रा स्फीति की) तथा (मात्र मुद्रा हास की)
D	Neither (Inflation only) nor (Deflation only)	न (मात्र मुद्रा स्फीति की) न (मात्र मुद्रा हास की)

Q.No: 155	Sample registration for collecting vital statistics is	जैव सांख्यिकी के एकत्रीकरण में प्रतिचयन पंजीकरण
A	A fixed panel survey	एक स्थिर पैनल सर्वेक्षण है
B	A Cross-sectional survey	एक क्रॉस-सेक्शनल सर्वेक्षण है
C	Both (A fixed panel survey) and (A Cross-sectional survey)	दोनों (एक स्थिर पैनल सर्वेक्षण है) तथा (एक क्रॉस-सेक्शनल सर्वेक्षण है)
D	Neither (A fixed panel survey) nor (A Cross-sectional survey)	न (एक स्थिर पैनल सर्वेक्षण है) न (एक क्रॉस-सेक्शनल सर्वेक्षण है)

Q.No: 156	In a time series if the demand of warm clothes is increased during winters, it is an example of	किसी काल श्रेणी में यदि जाड़ों में गर्म कपड़ों की माँग बढ़ती है तो यह उदाहरण है
A	Secular trend	दीर्घकालिक उपनति का
B	Seasonal variation	मौसमी विविधता का
C	Cyclical variation	चक्रीय विविधता का
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 157	Which type of variation is found in a statistically controlled process?	एक सांख्यिकीय रूप से नियन्त्रित प्रक्रिया में किस प्रकार की विविधता पायी जाती है ?
A	Non - random	यादृच्छिक रहित
B	Random	यादृच्छिक
C	Normal	प्रसामान्य
D	None of these	इनमें से कोई नहीं



Q.No: 158	Control charts for variables are based on which of the following distribution ?	चरों के नियंत्रित चित्र किस बंटन पर आधारित हैं ?
A	Normal	प्रसामान्य
B	Binomial	द्विपद
C	Poisson	पॉइसॉन
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 159	A lock out in a factory for a month represents which component of time-series?	किसी फैक्ट्री में एक महीने तक ताला बन्दी काल श्रेणी के किस अवयव को दर्शाती है ?
A	Cyclic Movement	चक्रीय संचलन
B	Seasonal Movement	मौसमी संचलन
C	Secular Movement	दीर्घकालिक उपनति
D	Irregular Movement	अनियमित संचलन

Q.No: 160	Under which one of the following conditions will the outcome of an experiment classified as success E or failure \bar{E} follow a Bernoulli distribution?	किसी प्रयोग की सफलता E या असफलता \bar{E} के रूप में वर्गीकृत परिणाम का बंटन निम्न प्रतिबन्धों में से कौन से एक के तहत बर्नौली बंटन होगा ?
A	$P(E) = \frac{1}{2}$	$P(E) = \frac{1}{2}$
B	$P(E) = 0$	$P(E) = 0$
C	$P(E) = 1$	$P(E) = 1$
D	$P(E)$ remains constant in all trials	सभी अभिप्रयोगों में $P(E)$ अचर रहता है

Q.No: 161	Fisher's ideal index number satisfies which of the following tests?	फिशर आदर्श सूचकांक निम्न में कौन से परीक्षणों को सन्तुष्ट करता है ?
A	Circular test only	चक्रीय परीक्षण मात्र
B	Time reversal test only	कालोत्क्रमण परीक्षण मात्र
C	Both (Circular test only) and (Time reversal test only)	दोनों (चक्रीय परीक्षण मात्र) तथा (कालोत्क्रमण परीक्षण मात्र)
D	Neither (Circular test only) nor (Time reversal test only)	न (चक्रीय परीक्षण मात्र) न (कालोत्क्रमण परीक्षण मात्र)

Q.No: 162	Let X be a continuous random variable with cumulating distribution function F(x). Y is defined as $Y=F(x)$. Then standard deviation of Y will be	माना X एक सतत चर है जिसका संचयी बंटन फलन F(x) है। Y को परिभाषित किया जाता है $Y=F(x)$ तो Y का मानक विचलन होगा
-----------	---	---

A	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
B	$1/2\sqrt{3}$	$1/2\sqrt{3}$
C	$1/12$	$1/12$
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 163	The number of non zero characteristic roots of a balanced incomplete block design with parameters (b, v, k, r, λ) is	संतुलित अपूर्ण खण्डक अभिव्यक्त्या, जिसके प्राचल (b, v, k, r, λ) आव्यूह के शून्य रहित अभिलाक्षणिक मूलों की संख्या होती है:
A	$\lambda b / r$	$\lambda b / r$
B	$\lambda b / k$	$\lambda b / k$
C	$\lambda r / k$	$\lambda r / k$
D	$\lambda v / k$	$\lambda v / k$

Q.No: 164	The layout of a 2^3 factorial experiment is given as				2^3 बहुउपादानी प्रयोग का अभिव्यास निम्न प्रकार दिया है			
	Replication -1		Replication-2		पुनरावृत्ति-1		पुनरावृत्ति-2	
	Block-1	Block-2	Block-3	Block-4	खण्डक -1	खण्डक -2	खण्डक-3	खण्डक-4
	(1)	a	abc	b	(1)	a	abc	b
	ab	b	bc	c	ab	b	bc	c
	abc	ac	a	ac	abc	ac	a	ac
	c	bc	(1)	ab	c	bc	(1)	ab
	The interactions confounded in two replicates are respectively				पुनरावृत्ति 1 तथा 2 में क्रमशः अन्वोद्य है:			
A	AB, ABC				AB, ABC			
B	AB, AC				AB, AC			
C	AC, BC				AC, BC			
D	None of these				इनमें से कोई नहीं			

Q.No: 165	In a 2^3 factorial experiment with 10 replications, the degrees of freedom due to	एक 2^3 बहुउपादानी अभिव्योग में, जिसमें 10 पुनरावृत्तियाँ हैं, त्रुटि स्वातंत्र कोटि है:
-----------	---	---

	error is	
A	79	79
B	63	63
C	59	59
D	19	19

Q.No: 166	Which of the following distribution has a pair of degrees of freedom?	निम्न में कौन सा बंटन युग्म स्वतंत्र कोटि वाला है ?
A	Normal	प्रसामान्य
B	Binomial	द्विपद
C	Chi-Square	काई वर्ग
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 167	The central limit theorem assures us that the sampling distribution of mean	केन्द्रीय सीमा प्रमेय हमें यह आश्वासन करता है कि माध्य का प्रतिदर्श बंटन
A	Is always normal	सदैव प्रसामान्य है
B	Appears normal only when population size is greater than 100	केवल प्रसामान्य प्रतीत होता है जब समष्टि अमाप 100 से अधिक है
C	Approaches normality as sample size increases	प्रसामान्य की ओर अग्रसर होता है जैसे-जैसे प्रतिदर्श आकार बढ़ता है
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 168	If in a symmetric distribution first quartile is 54.52 and third quartile is 78.86, the median of this distribution will be	यदि किसी सम बंटन में प्रथम चतुर्थांक 54.52 है तथा तृतीय चतुर्थांक 78.86 है तो इस बंटन की मायिका होगी:
A	12.17	12.17
B	39.43	39.43
C	66.69	66.69
D	133.38	133.38

Q.No: 169	Which one of the following is not possible for a binominal distribution ?	निम्न में से कौन द्विपद बंटन के लिये सम्भव नहीं है ?
A	Mean = 2, Variance = 3/2	माध्य = 2, प्रसरण = 3/2
B	Mean = 5, Variance = 9	माध्य = 5, प्रसरण = 9
C	Mean = 10, Variance = 5	माध्य = 10, प्रसरण = 5



D	Mean = 4, Variance = 8/3	माध्य = 4, प्रसरण = 8/3
---	--------------------------	-------------------------

Q.No: 170	Poisson distribution is a limiting case of	प्वॉसा बंटन एक सीतान्त अवस्था है
A	Normal distribution	प्रसामान्य बंटन का
B	Uniform distribution	सम बंटन का
C	Binominal distribution	द्विपद बंटन का
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 171	The region in which null hypothesis is rejected, is called:	वह क्षेत्र जहाँ शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है, कहलाता है:
A	Level of significance	सारथकता स्तर
B	Region of Acceptance	स्वीकृत क्षेत्र
C	Critical Region	क्रान्तिक क्षेत्र
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 172	Let $\rho_{1.2 \dots p}$ be the population multiple correlation coefficient of x_1 on x_2, x_3, \dots, x_p . Then in order to test the null hypothesis $H_0: \rho_{1.2 \dots p} = 0$, which of the following test is used?	मान लीजिये कि $\rho_{1.2 \dots p}$, x_2, x_3, \dots, x_p पर x_1 का समष्टि अनेकधा सहसम्बंध है तो n आकार के यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर शून्य परिकल्पना $H_0: \rho_{1.2 \dots p} = 0$ के परीक्षण के लिये निम्न में कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है ?
A	Chi-Square	काई वर्ग
B	t	t
C	Normal	प्रसामान्य
D	F	F

Q.No: 173	Which one of the following is one the basic principles of design of experiments?	निम्न में कौन प्रयोगों की अभिकल्पना का एक मूलभूत सिद्धांत है ?
A	Confounding	संकरण
B	Error Control	त्रुटि नियन्त्रण
C	Compounding	संयोजन
D	Sampling	प्रतिचयन

Q.No: 174	If a systematic sample of size 10 taken from a population of size 100, the 27 th ,	यदि 100 आकार के किसी समष्टि से 10 आकार के लिये गये एक क्रमबद्ध प्रतिदर्श में समष्टि की 27वीं, 87वीं,
-----------	---	--



	87 th , 57 th , 97 th , and 7 th , units of the population are included, then rest of the five units of the sample are	57वीं, 97वीं तथा 7वीं इकाइयाँ शामिल हुयी है, तो प्रतिदर्श की शेष पाँच इकाइयाँ है
A	17 th , 67 th , 37 th , 77 th and 47 th units of population	समष्टि की 17 वीं, 67 वीं, 37 वीं, 77 वीं तथा 47 वीं इकाइयाँ
B	10 th , 20 th , 30 th , 40 th and 50 th units of the population	समष्टि की 10 वीं, 20 वीं, 30 वीं, 40 वीं तथा 50 वीं इकाइयाँ
C	1 st , 2 nd , 3 rd , 4 th , and 5 th units of the population	समष्टि की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तथा पाँचवीं इकाइयाँ
D	Any five units of the population	समष्टि की कोई भी पाँच इकाइयाँ

Q.No: 175	Let X be uniformly distributed over the interval [1, 3], then value of x_0 such that $\Pr [X < 2 + x_0] = 3/4$, is	मान लीजिये कि X अन्तराल [1, 3] में समरूप से बँटित है, तो x_0 का मान इस प्रकार कि $\Pr [X < 2 + x_0] = 3/4$ होगा
A	3/4	3/4
B	3/2	3/2
C	1/2	1/2
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 176	A distribution has variance 16, $\gamma_1 = 1$ and $\beta_2 = 4$. Then, third and fourth central moments are respectively	किसी बँटन का प्रसरण 16, $\gamma_1 = 1$ तथा $\beta_2 = 4$ है तो तीसरा तथा चौथा आकृत्य क्रमशः हैं:
A	(64, 1020)	(64, 1020)
B	(60, 1024)	(60, 1024)
C	(65, 1024)	(65, 1024)
D	(64, 1024)	(64, 1024)

Q.No: 177	The standard deviation of two variables are $\sigma_1 = 2$ and $\sigma_2 = 3$ and the correlation. Coefficient between them is $1/2$. If θ is the acute angle between the lines of regression for these variables, then values of $\tan \theta$ is:	दो चरों के मानक विचलन $\sigma_1 = 2$ तथा $\sigma_2 = 3$ हैं तथा उनके मध्य सहसम्बंध गुणांक $1/2$ है। यदि इन चरों की समाश्रयण रेखाओं के बीच का न्यून कोण θ है, तो $\tan \theta$ का मान है:
A	7/13	7/13
B	9/19	9/19
C	9/13	9/13
D	6/19	6/19

Q.No: 178	Let X and Y be two random variables such that $Y = (X-a)/b$ where a and b (> 0) are constants. Then, which of the following is true?	मान लीजिये X तथा Y दो यादृच्छिक चर इस प्रकार हैं कि $Y = (X-a)/b$ जहाँ a तथा b (> 0) स्थिरांक हैं। तो निम्न में कौन सत्य है ?
-----------	--	---

A	Mean(X) = b Mean(Y)	माध्य (X) = b माध्य (Y)
B	Standard Deviation (X) = Standard Deviation (Y)	मानक विचलन (X) = मानक विचलन (Y)
C	Mean (X) = Mean (Y)	माध्य (X) = माध्य (Y)
D	Standard Deviation (X) = b Standard Deviation (Y)	मानक विचलन (X) = मानक विचलन (Y)

Q.No: 179	Index numbers measure	सूचकांक मापते हैं
A	Relative Change Only	सापेक्ष परिवर्तन मात्र
B	Absolute Change only	पूर्ण परिवर्तन मात्र
C	Both (Relative Change Only) and (Absolute Change only)	(सापेक्ष परिवर्तन मात्र) तथा (पूर्ण परिवर्तन मात्र) दोनों
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 180	Loss of working days due fire in a factory is associated to whom in the following?	किसी कारखाने के कार्य दिवसों में आग लगने के कारण हुई हानि निम्न में किससे सम्बन्धित है
A	Trend	उपनति
B	Seasonal component	मौसमी संघटक
C	Cyclical component	चक्रीय संघटक
D	Random component	अनियमित संघटक

Q.No: 181	Irregular variations in a time series are caused by	काल श्रेणी में अनियत विचरणों का कारण होते हैं
A	Strikes	हड़ताल
B	Epidemics	महामारी
C	Floods	बाढ़
D	All of these	सभी सही हैं

Q.No: 182	A time series consists of	काल श्रेणी निर्मित होती है
A	Long term fluctuations only	मात्र दीर्घकालीन उच्चावचनों से
B	Short term fluctuations only	मात्र अल्पकालीन उच्चावचनों से
C	Irregular variations only	मात्र अनियत विचरणों से
D	All of these	सभी सही हैं



Q.No: 183	Link relative means the ratio of a value to its:	श्रृंखलित आपेक्षक का अभिप्राय होता है, मान का अनुपात उसके
A	Succeeding value	उत्तरवर्ती मान से
B	Preceding value	पूर्ववर्ती मान से
C	Both (Succeeding value) and (Preceding value)	(उत्तरवर्ती मान से) तथा (पूर्ववर्ती मान से) दोनों
D	Neither (Succeeding value) nor (Preceding value)	न (उत्तरवर्ती मान से) न (पूर्ववर्ती मान से)

Q.No: 184	Which one of the following is not a vital event?	निम्न में कौन एक जीवन घटना से सम्बन्धि नहीं है ?
A	Birth	जन्म
B	Marriage	विवाह
C	Education	शिक्षा
D	Migration	माइग्रेशन

Q.No: 185	Vital rates are expressed as	प्राणभूत दरों को प्रदर्शित किया जाता है:
A	Percentages	प्रतिशत में
B	Per thousand	प्रति हजार में
C	Per million	प्रति दस लाख में
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 186	The probability of a death of a person between ages x and $(x+1)$ is called:	x तथा $(x+1)$ वर्ष के बीच में व्यक्ति की मृत्यु की प्रायिकता को कहा जाता है:
A	Age specific death rate	आयु विशिष्ट मृत्यु दर
B	Infant mortality rate	बाल मृत्यु दर
C	Central mortality rate	केन्द्रीय मृत्यु दर
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 187	\bar{X} and R Chart are used for	\bar{X} तथा R चार्ट प्रयुक्त होते हैं:
A	Production control	उत्पाद नियन्त्रण के लिये
B	Process control	प्रक्रिया नियन्त्रण के लिये



C	Material control	सामग्री नियन्त्रण के लिये
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 188	Quality of a manufactured product is measured by	निर्मित उत्पाद की गुणता नापी जाती है:
A	Numerical measurement only	मात्र संख्यात्मक मापन द्वारा
B	Attribute measurement only	मात्र गुणता मापन द्वारा
C	Both (Numerical measurement only) and (Attribute measurement only)	दोनों (मात्र संख्यात्मक मापन द्वारा) तथा (मात्र गुणता मापन द्वारा)
D	Neither (Numerical measurement only) nor (Attribute measurement only)	न (मात्र संख्यात्मक मापन द्वारा) न (मात्र गुणता मापन द्वारा)

Q.No: 189	np chart is a control chart for	किसके लिये np चित्र एक नियन्त्रण चित्र है ?
A	Number of defects per unit	प्रति इकाई दोषों की संख्या
B	Fraction defectives	दोषपूर्ण का अंश
C	Number of defectives	दोषपूर्ण की संख्या
D	All of these	सभी सही है

Q.No: 190	A typical control chart consists of	एक विशिष्ट नियन्त्रण चित्र में होती है:
A	Two horizontal lines	दो क्षैतिज रेखायें
B	Three horizontal lines	तीन क्षैतिज रेखायें
C	Five horizontal lines	पाँच क्षैतिज रेखायें
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 191	If the lower control limit is negative in control Charts for attributes , it is taken as:	यदि गुणों के चित्र में न्यूनतम नियन्त्रण सीमा ऋणात्मक है तो इसको लिया जाता है
A	1	1
B	As it is	जैसी है वैसी ही
C	1.5	1.5
D	0	0

Q.No: 192	Variation in the quality of manufactured product is tolerable due to	निर्मित उत्पाद की गुणता में परिवर्तन निम्न के कारण सहनीय होता है:
-----------	--	---



A	Chance causes only	संयोग मात्र
B	Assignable causes only	निर्धारणीय मात्र
C	Both (Chance causes only) and (Assignable causes only)	(संयोग मात्र) तथा (निर्धारणीय मात्र) दोनों
D	Neither (Chance causes only) nor (Assignable causes only)	नहीं (संयोग मात्र) नहीं (निर्धारणीय मात्र)

Q.No: 193	A group of moving average consists of	चल औसत का एक समूह होता है
A	5 years period	5 वर्ष की अवधि का
B	3 years period	3 वर्ष की अवधि का
C	A period which form a cycle	एक अवधि जो एक चक्र बनाता है
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 194	In which of give following conditions, Poisson's distribution would be a good approximation of binominal distribution $b(x; n, p)$?	निम्न में किसकी परिस्थिति में प्वॉसॉन बंटन द्विपद बंटन $b(x; n, p)$ का एक अच्छा सन्निकट होगा ?
A	$n = 200, q = 0.98$	$n = 200, q = 0.98$
B	$n = 400, p = 0.52$	$n = 400, p = 0.52$
C	$n = 10, p = 0.03$	$n = 10, p = 0.03$
D	$n = 40, q = 0.79$	$n = 40, q = 0.79$

Q.No: 195	If E1 and E2 are two independent events such that $P(E1) = P(E2) = 0.8$, then $P(E1 \cup E2)$ is equal to	यदि E1 तथा E2 दो स्वतंत्र घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $P(E1) = P(E2) = 0.8$ तो $P(E1 \cup E2)$ का मान है
A	0.64	0.64
B	0.80	0.80
C	0.96	0.96
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 196	Let X and Y be two random variables such that mean of each is 10 and variances are 1 and 10 respectively. If correlation coefficient between them is $1/4$, then the covariance between $3X$ and $5Y$ is	माना X तथा Y, जिनमें प्रत्येक का माध्य 10 तथा प्रसरण क्रमशः 1 तथा 9 है, दो यादृच्छिक चर हैं। इन चरों का सहसम्बन्ध गुणांक $1/4$ है। तब $3X$ तथा $5Y$ का सहप्रसरण होगा:
A	34	34
B	15.75	15.75
C	11.25	11.25



D	None of these	इनमें से कोई नहीं
---	---------------	-------------------

Q.No: 197 In case of SRSWOR if $S^2 = \sum_i^n (y_i - \bar{Y})^2 / (N - 1)$ then $V(\bar{y})$ will be

SRSWOR के लिए यदि $S^2 = \sum_i^n (y_i - \bar{Y})^2 / (N - 1)$ है तो $V(\bar{y})$ होगा

A	$\frac{N-n}{N} \frac{S^2}{n}$	$\frac{N-n}{N} \frac{S^2}{n}$
B	$\frac{N-1}{N} \frac{S^2}{n}$	$\frac{N-1}{N} \frac{S^2}{n}$
C	$\frac{N-1}{n-1} \frac{S^2}{N}$	$\frac{N-1}{n-1} \frac{S^2}{N}$
D	$\frac{N-n}{n-1} \frac{S^2}{N}$	$\frac{N-n}{n-1} \frac{S^2}{N}$

Q.No: 198 A spelling test was conducted on 30 students. All of them spelled 8 out of 10 words correctly. Then this distribution has

30 विद्यार्थियों का spelling परीक्षण किया गया। प्रत्येक ने 10 में से 8 शब्द सही लिखे इस बंटन का ?

A	Zero standard deviation	मानक विचलन शून्य है
B	Zero mean	माध्य शून्य है
C	Both mean and standard deviation are zero	माध्य तथा मानक विचलन दोनों शून्य है
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 199 The mean of 15 observations is 3 and their range is zero. Then, maximum observation is

15 प्रेक्षकों का माध्य 3 है तथा इनका परास शून्य है तो इनमें महत्तम प्रेक्षक है:

A	0	0
B	3	3
C	More than 3	3 से अधिक
D	None of these	इनमें से कोई नहीं

Q.No: 200 If $r_{12} = r_{13} = r_{23} = r$, the value of multiple correlation coefficient $R_{1(23)}$ is:

यदि $r_{12} = r_{13} = r_{23} = r$ है तो बहुसहसम्बंध गुणांक $R_{1(23)}$ का मान है:

A	0	0
---	---	---



B	$\frac{1}{1+r/2r}$	$\frac{1}{1+r/2r}$
C	$\frac{1}{1+r/2r}$	$\frac{1}{1+r/2r}$
D	$\frac{r\sqrt{2}}{\sqrt{1+r}}$	$\frac{r\sqrt{2}}{\sqrt{1+r}}$



Teachingninja.in